









Epidemiologie zhoubného novotvaru močového měchýře (C67)



Incidence ^{1,3}	
Počet případů na 100 000 osob	Celkem: 21,7 M: 32,7 / Ž: 11,0
Průměrný počet případů ročně	Celkem: 2 309 M: 1 714 / Ž: 595
Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	M: 5,2 % Ž: 2,1 %
Věk (medián, 25.–75. perc., podíl osob do 60 let)	M: 72 (66–78) let, 11,5 % Ž: 73 (67–79) let, 9,3 %
Poměr muži : ženy	3,0 : 1
Mortalita ^{2,3}	
Počet případů na 100 000 osob	Celkem: 8,4 M: 12,3 / Ž: 4,7
Průměrný počet případů ročně	Celkem: 899 M: 646 / Ž: 253
Podíl ze ZN (C00–C97 bez C44)	M: 4,3 % Ž: 2,0 %
Prevalence ^{1,4}	
Počet případů na 100 000 osob	Celkem: 184,9 M: 271,3 / Ž: 101,6
Absolutní počet	Celkem: 19 894 M: 14 323 / Ž: 5 571



¹ Zdroj dat: Národní onkologický registr | ² Zdroj dat: Český statistický úřad | ³ Roční průměr za období 2018–2022 | ⁴ K 31. 12. 2022 | M – muži, Ž – ženy